

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၄ /၂၀၂၃)
၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၂ ရက်
(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်)

မြန်မာနိုင်ငံတွင်သုံးစွဲရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်သည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်းမှ
Ethylene Oxide အား ပယ်ဖျက်၍ ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ်
ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

- ၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေပုဒ်မ ၄၇။ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
- ၂။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ(၂/၂၀၂၁)ဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသုံးစွဲရန် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည့် ပိုးသတ်ဆေး(၅၅)မျိုးအနက်မှ အမှတ်စဉ်(၂၂) Ethylene Oxide အား ပယ်ဖျက်၍ တားမြစ်ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ်မှ ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင် သတ်မှတ်လိုက်သည်။
- ၃။ အဆိုပါ Ethylene Oxide အား အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပူးတွဲဖော်ပြပါ အချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
- ၄။ အထက်အပိုဒ် (၂)နှင့် (၃)ပါ ထုတ်ပြန်ချက်ကို လိုက်နာခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

(ဒေါက်တာဝင်ထွဋ်)
ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့

စာအမှတ်၊ ပမမ - ၃ / ၂၀၂၃ (၁၂၈၅)
ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံး
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး
အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး

ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအားလုံး
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
နေပြည်တော်ကောင်စီ
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ(အားလုံး)
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီဝင်များနှင့်ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန (မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း အပိုင်း-၁ တွင် ထည့်သွင်း
ကြော်ငြာပေးပါရန်)

ဤဝန်ကြီးဌာနရှိဦးစီးဌာနအားလုံး

အမိန့်အရ

(ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း)

အတွင်းရေးမှူး၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့

Ethylene Oxide Gas အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်အချက်များ

Ethylene Oxide Gas သည် အသုံးပြုသူတို့၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် ပူးတွဲပါကိုးကားချက်များ အရ ကင်ဆာရောဂါအထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါသောကြောင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းတွင် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် -

- (က) Ethylene Oxide Gas အသုံးပြု၍ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Surgical Mask) များအား ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း မဆောင်ရွက်ရပါ။
- (ခ) Ethylene Oxide Gas အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ISO 11135: 2014, IDT, "Sterilization of health -care products- Ethylene oxide Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices " အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ဂ) ISO 10993-7 Biological evaluation of medical devices, Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals အရ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး (တစ်ခါသုံး) ဝတ်စုံကဲ့သို့သော လူနှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ရသောအဝတ်များတွင် Ethylene oxide sterilization residual ပမာဏမှာ $10\mu/\text{cm}^2$ အတွင်း၌ ရှိရန်၊
- (ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်လေထုနှင့်ရေထု ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန် သင့်လျော်သောအစီအမံများ ပြုလုပ်ထားပြီး "အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးလမ်းညွှန်ချက်များ" တွင် ပါဝင်သော သတ်မှတ်စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ထားရန်၊
- (င) EO Gas နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်း စေရန်အတွက် EO Gas နှင့် ပတ်သက်သော လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပညာပေးရန်၊
- (စ) EO Gas နှင့် ထိတွေ့လုပ်ကိုင်နေရသော ဝန်ထမ်းများအား သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွင်သုံး တစ်ကိုယ်ရေ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျဝတ်ဆင်စေရန်နှင့် ၎င်းဝန်ထမ်းများအား (၆)လတစ်ကြိမ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
- (ဆ) အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအစီအမံများ (မီးဘေးအန္တရာယ်နှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်) ရေးဆွဲ၍ ဝန်ထမ်းများအား လက်တွေ့သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးရန်၊
- (ဇ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန်အတွက် Exhaust Fan များ တပ်ဆင်ထားရန်၊

- (ဈ) EO Gas Cylinder များအား လုံလောက်သောအကျယ်အဝန်း၊ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆများနှင့်အညီ စနစ်တကျလုံခြုံစွာ လူအများ လက်လှမ်းမမီသော နေရာများတွင် ထားသို၍ သုံးစွဲမှုမှတ်တမ်းများ ထားရှိရန်၊
- (ည) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် Gas Sensor များ တပ်ဆင်ထားရန်၊
- (ဋ) လုပ်ငန်းခွင်လေထုထဲတွင် EO Gas ပမာဏအား အလုပ်ချိန် (၈)နာရီအတွင်း 1 ppm အတွင်းရှိ/မရှိကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် တိုင်းတာစစ်ဆေးရန်နှင့် တိုင်းတာမှု မှတ်တမ်းများ ထားရှိရန်၊ Ethylene Oxide ပမာဏမှာ 1ppm ထက်ပိုပါက ပိုးသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းပြီး ကျော်လွန်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သော ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ပမာဏအတွင်း ပြန်လည်ရရှိမှသာ လုပ်ငန်း များ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ဌ) တစ်ခါသုံးခွဲစိတ်ခန်းသုံးဝတ်စုံနှင့် ခွဲစိတ်သည့်နေရာသန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် အသုံးပြုသော အခင်းများအား Ethylene Oxide Gas အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ဍ) Ethylene Oxide Gas အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း ဆောင်ရွက်လိုပါက ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲမှ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ထောက်ခံစာနှင့်အတူ လျှောက်ထားရန်။

Ethylene Oxide Gas အသုံးပြု၍ ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့်
အချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက အလုပ်သမားများတွင်
ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော ကျန်းမာရေးပြဿနာများ

- (က) Ethylene Oxide Gas သည် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်း ဆောင်ရွက်သူများ၏ အသက်ရှူ
လမ်းကြောင်းနှင့် အရေပြားကို ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပြီး ရေတိုသက်ရောက်မှုများအဖြစ်
နှာခေါင်းနှင့်လည်ချောင်း ယားယံခြင်း၊ အရေပြားယားယံခြင်း၊ မျက်စိယားယံခြင်း၊
ပျို့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု
ရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
- (ခ) ရေရှည်သက်ရောက်မှုများအနေဖြင့် မျက်စိတိမ်စွဲခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း၊
ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများဖြစ်ပွားခြင်း၊ သွေးရောဂါဖြစ်ပွားခြင်း၊
မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့် သားပျက်သားလျှော့ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- (ဂ) Ethylene Oxide Gas ရှူသွင်းမိခြင်းမှတစ်ဆင့် သွေးကင်ဆာရောဂါနှင့် အမျိုးသမီးများ
တွင် ရင်သားကင်ဆာတို့ ဖြစ်ပွားစေနိုင်သောကြောင့် Ethylene Oxide Gas ကို
ကင်ဆာဖြစ်စေတတ်သော ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။